



Tympanoplastia

Educación para paciente y la Familia

Esta hoja educativa contiene información general. Si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor hable con la enfermera de la oficina al (813) 262-1330.

¿Qué es una timpanoplastia? Una timpanoplastia es una reparación quirúrgica del tímpano. El procedimiento se realiza a menudo para una perforación del tímpano o reforzar una debilitada, tímpano retraído mientras que a menudo mejorar la audición. Existen diversas técnicas para reparar un tímpano. Dependiendo de la indicación para la cirugía de su hijo(a), el cirujano puede optar por operar a través de la membrana del tímpano, o de una incisión oculta detrás de la oreja. Fascia o el cartílago cercanos a menudo se utilizan como materiales para reparar el tímpano.

¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse?

La cirugía es ambulatoria. Los niño(s) por lo general pueden regresar a la escuela a los pocos días después de que el apósito se ha bajado y ya no necesitará medicamentos recetados.

¿Cuáles son los riesgos de una timpanoplastia? Los riesgos de este procedimiento incluyen la falta de curar / re-perforación, hemorragia, infección o alteración del gusto temporal. Cualquier cirugía de oído, teóricamente, puede tener un riesgo de dañar la audición, el equilibrio o la función del nervio facial, pero esto es muy rara (<1%).

¿Cómo puedo cuidar el oído de mi hijo?

1. Dolor: En el mostrador Tylenol y Motrin son mejores medicamentos para la cirugía de oído. El cirujano de su hijo(a) puede recetar un medicamento de prescripción adicional en ciertos casos.
2. Cuidado de Herida: Sangre teñida drenaje del conducto auditivo o incisión es normal y esperado después de la cirugía de orejas. Coloca un ungüento entregado incisión de 2-3 veces al día durante 7 días. Después de eso, pomada Aquaphor se puede colocar sobre la incisión de 2-3 veces al día hasta primera cita post-operatorio. Muchas veces un antibiótico se prescribe en espera de lo que se encuentra en el oído. Las suturas son absorbibles.
3. Precauciones Agua: Coloca una bola de algodón en el entrada del canal oído auditivo en la ducha para mantener el oído canal seco. Botalo después de la ducha. No sumerja la herida o la oreja bajo el agua (es decir, bañarse o nadar) hasta quela cita con su cirujano.
4. Post-Op cita: Una cita de seguimiento debe hacerse en nuestra oficina durante 3 semanas después de la cirugía. Nos vemos de nuevo posteriormente aproximadamente 3 meses después de la cirugía y la prueba de audición de su hijo. A menudo, el cirujano tendrá a su hijo en gotas para los oídos para ser iniciado hace 1 semana antes de la primera visita a la clínica

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame a la oficina si su hijo experimenta:

- Una temperatura más de 101.5° F
- Dolor de oído que no se alivia con la medicación administrada
- Difundir enrojecimiento en la piel cerca de la incisión
- El sangrado incontrolable
- Si usted tiene alguna preocupación acerca de cómo su hijo(a) se ve o se siente